


Интегрисане академске студије медицине
предмет: Интерна медицина 1


Анализа резултата теста ретенције знања

- Наставу на предмету положило је 103 студента
- Тест ретенције знања радило је 75 студената

Број остварених бодова на тесту ретенције



- Тест је био састављен од 20 питања.
- Број тачних одговора по питању разматран је по нумерацији питања теста А.



Питање са најмањим бројем тачних одговора 30,7% (23 студента)

- Навести два најчешћа клиничка симптома идиопатске фиброзе плућа:

1. _____

2. _____

Питање на које је 40% студената дало тачан одговор (30 студента)

- **Једна од набројаних група лекова се не користи за брзо отклањање симптома астме (1):**
 - 1) Брзоделујући инхалациони β_2 -агонисти (салбутамол, фенотерол, тербуталин)
 - 2) Системски кортикостероиди
 - 3) Антихолинергици (ипратропиум)
 - 4) Метилксантини
 - 5) Модификатори леукотриена

Питања са највећим бројем тачних одговора
96% (72 студента)

- **Златни стандард за дијагностику коронарне болести срца је (1):**

1) ехокардиографија

2) тест оптерећења

3) стрес ехокардиографија


4) коронарна ангиографија

Питања са највећим бројем тачних одговора 96% (72 студента)


- **Вирховљева жлезда се палпира (1):**

- 1) у обе наткључне јаме код болесника са non-Hodgkin лимфомом
- 2) у десној наткључној јами код болесника са тумором епифаринкса
- 3) у обе наткључне јаме код болесника са карциномом плућа
- 4) у левој наткључној јами код болесника са карциномом желуца


Упоредна анализа успешности на завршном испиту и тесту ретенције



Упоредна анализа успешности на завршном испиту и тесту ретенције



Упоредна анализа успешности на завршном испиту и тесту ретенције



Остварена корелација резултата

Correlations			
		Процент на тесту ретенције	Бодови на испиту
Процент на тесту ретенције	Pearson Correlation	1	.585**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	75	70
Бодови на испиту	Pearson Correlation	.585**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	70	70