

## ТЕСТ ПИТАЊА

Интензивна клиничка нега код акутних психијатријских стања

1. Разлози за присилни хоспитални третман психијатријског пацијента су:

- A. ризик од самоубиства
- B. тешкоће са спавањем
- C. озбиљни психотични симптоми
- D. страх и напетост
- E. озбиљан ризик да науде другима

-тачни одговори: А, Ц, Е

2. Како се опходити према агресивном болеснику?

- A. разговарати са њим „очи у очи“
- B. разговарати са њим у просторији где су и остали чланови тима

-тачан одговор: Б

3. Најчешћа ургентна стања у психијатрији су?

- A. покушај суицида
- B. афективни поремећај- манична стања
- C. злоупотреба ПАС
- D. поремећаји личности
- E. делиријум тременс

-тачан одговор: А и Е

4. Ургентно стање код ментално инсуфицијентних особа назива се:

- A. анксиозност
- B. еретизам
- C. агитација

-тачан одговор: Б

5. Код делирантних пацијената најургентнија је:

- A. надокнада течности и елекролита
- B. примена антипсихотика
- C. нега и надзор
- D. контрола урина

-тачан одговор: А и Ц

6. Физичка и медикаментозна фиксација пацијента је неопходна у случају:

- A. опсесивно- компулсивног поремећаја
- B. епилепсије
- C. агитираног психотичног пацијента

-тачан одговор: Ц

7. Ургентна психијатријска стања се лече у \_\_\_\_\_  
-тачан одговор: психијатријска интензивна нега
8. Праћење комплијансе (редовног коришћења терапије) у болничким условима обавља:  
А. спремачица  
В. медицински техничар  
С. надзире лекар  
Д. апотекар  
-тачан одговор: Б и Ц
9. Апликација депо препарата може се спороводити у условима интензивне неге:  
А. да  
В. не  
-тачан одговор: А
10. Узимање прописане терапије након хоспиталног лечења врши:  
А. искључиво сам пацијент  
В. пацијент уз надзор породице  
-тачан одговор: Б
11. Симптоми повезани са паничним нападом су:  
А. лупање срца  
В. прескакање срца  
С. презнојавање  
Д. кратак дах  
Е. осећај гушења  
Ф. мучнина  
Г. вртоглавица  
Н. осећај губљења контроле  
И. страх  
Ј. све наведено  
-тачан одговор: Ј
12. Да ли постоји ризик од самоубиства код паничних напада?  
А. Постоји, посебно ако се често понављају или су удружени са депресивним поремећајем или злоупотребом психоактивних супстанци  
В. не  
-тачан одговор: А
13. Извор страха код фобичних пацијената налази се:  
А. споља  
В. изнутра  
-тачан одговор: А
14. Суицидално понашање (рискантан начин живота) се може јавити код:

- A. деменције
  - B. менаталне ретардације
  - C. алкохолизма и злоупотребе дрога
- тачан одговор: Ц

15. Лечење акутног тровања, као облика суицидалног понашања, спроводи се:

- A. у Ургентним центрима
  - B. Јединицама интензивне психијатријске неге
- тачан одговор: А

16. Код психијатријских пацијената који се лече на другим одељењима треба:

- A. обавезно консултовати психијатра
  - B. обавезно консултовати инфектолога
  - C. није потребна конустација психијатра, осим у случају погоршања психичког стања пацијента
- тачан одговор: Ц

17. Могућа је сличност симптома паничног напада са:

- A. епилептичним нападом
  - B. инфарктом миокарда
  - C. синкопом
- тачан одговор: Б и Ц

18. Манично стање је фаза \_\_\_\_\_ поремећаја.

-тачан одговор: биполарног

19. Манична стања се у акутној фази лече:

- A. стабилизаторима расположења
  - B. антипсихотицима
  - C. оба наведена
- тачан одговор: Ц

20. При апликацији ЕКТ- а асистирају:

- A. медицински техничар
  - B. анестезиолог
  - C. психијатар
  - D. дерматолог
  - E. неурохирург
- тачан одговор: А, Б, Ц

21. Пацијенти са параноичним поремећајем могу имати:

- A. уске зенице
  - B. очувану фасаду
- тачан одговор: Б

22. Диференцијална дијагноза код шизофрених пацијената у акутној фази може бити:

- A. манија
  - B. фобија
  - C. поремећај личности
  - D. алкохолисано стање
- тачан одговор: А и Ц

23. Форма шизофреније која се најчешће виђа у психијатријској интензивној нези је:

- A. негативна форма
  - B. флоридна форма
- тачан одговор: Б

24. Шизофрени пацијенти могу бити опасни:

- A. по околину
  - B. по себе
  - C. за материјална добра
- тачан одговор: А, Б, Ц

25. Терапија суманутих агитираних стања подразумева:

- A. парентералну апликацију антидепресива
  - B. парентералну апликацију антипсихотика
  - C. парентералну апликацију бензодиазепина
- тачан одговор: Б и Ц

26. Да ли је оправдано, при савлађивању оболеле особе, ангажовати и:

- A. специјално обучено особље- обезбеђење
  - B. полицију
  - C. ватрогасце
- тачан одговор: А и Б

27. У стањима страха долази до повећања нивоа:

- A. хемоглобина
  - B. адреналина
  - C. хормона раста
  - D. окситоцина
- тачан одговор: Б

28. Основни услов за лечење наркомана је

- A. Присила
  - B. Мотивисаност
  - C. Мере обавезног лечења
- тачан одговор: Б

29. Акутни мождани психосиндром познат је као:

- A. Синдром морије
- B. Синдром делиријума

С. Синдром парафреније  
-тачан одговор: Б

30. Изражене екстрапирамидне нузпојаве има:

- А. Клозапин
  - В. Халоперидол
  - С. Сулпирид
- тачан одговор: Б

31. Депресивни поремећаји су ургентна стања због ризика од \_\_\_\_\_.

-тачан одговор: суицида

32. Када се пацијент придржава савета и препорука здравствених радника и има жељу за излечењем његов однос према болести је:

- А. капитулирајући
  - В. активно-сарађујући
  - С. избегавајући
  - Д. одбацујући
- тачан одговор: Б

33. Сумрачна стања су стања:

- А. сужене свести
  - В. помућене свести
  - С. проширене свести
- тачан одговор: А

34. Сумрачно стање се јавља код:

- А. маније
  - В. патолошког напитога стања
  - С. депресије
  - Д. темпоралне епилепсије
- тачан одговор: Б и Д

35. Ментална конфузија се јавља код \_\_\_\_\_.

-тачан одговор: тоksiинфекцијских оштећења

36. Код интоксикације алкохолом свест може бити:

- А. сужена
  - В. помућена
  - С. пацијент није свестан
- тачан одговор: А, Б и Ц

37. Код акутних стања изазваних злоупотребом ПАС рутински се обавља:

- А. тест крви на HIV и HCV
- В. скрининг тест урина на дроге

С. тест на ТВС (Mantoux проба)  
-тачан одговор: Б

38. Код агитираних болесника са епилепсијом даје се:

- А. антиконвулзант са бензодиазепином
  - В. налтрексон
  - С. халоперидол са бензодиазепинима
- тачан одговор: А

39. Делирантна стања могу бити изазбана:

- А. алкохолом
  - В. инфекцијом
  - С. хипоксијом
  - Д. хепатичном енцефалопатијом
  - Е. све наведено
- тачан одговор: Е

40. Делирантно стање је потенцијално смртоносно код:

- А. једне трећине до једне половине пацијента
  - В. није смртоносно
- тачан одговор: А